

厚生労働省告示第 269 号／平成 27 年 5 月 20 日告示／平成 27 年 5 月 20 日施行

区分	商品名	規格単位	会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	備考
内用薬	ワントラム錠 100mg	100mg1 錠	日本新薬	トラマドール塩酸塩	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛 疼痛を伴う各種癌、慢性疼痛	通常、成人にはトラマドール塩酸塩として100～300mgを1日1回経口投与する。 なお、症状に応じて適宜増減する。ただし、1日400mgを超えないこととする。	劇、処方	新剤型・ 新用量
内用薬	ノピコール カプセル 2.5μg	2.5μg 1 カプセル	東レ・ メディカル	ナルフラフィン塩酸塩	次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 血液透析患者、慢性肝疾患患者	通常、成人には、ナルフラフィン塩酸塩として1日1回2.5μgを夕食後又は就寝前に経口投与する。なお、症状に応じて増量することができるが、1日1回5μgを限度とする。	劇、処方	新有効成分
内用薬	オプスミット錠 10mg	10mg1 錠	アクテリオン ファーマシュー ン ーティカルズ ジャパン	マシテンタン	肺動脈性肺高血圧症	通常、成人には、マシテンタンとして10mgを1日1回経口投与する。	劇、処方	新有効成分
内用薬	ザファテック錠 50mg ザファテック錠 100mg	50mg1 錠 100mg1 錠	武田薬品工 業	トレラグリ プチンコハ ク酸塩	2型糖尿病	通常、成人にはトレラグリプチンとして100mgを1週間に1回経口投与する。	処方	新有効成分
内用薬	サデルガ カプセル 100mg	100mg 1 カプセル	ジェンザイ ム・ジャパン	エリグルス タット酒石 酸塩	ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	通常、CYP2D6 Extensive Metabolizer及びIntermediate Metabolizerの成人にはエリグルスタット酒石酸塩として1回100mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。	劇、処方	新有効成分
内用薬	レンビマ カプセル4mg レンビマ カプセル10mg	4mg 1 カプセル 10mg 1 カプセル	エーザイ	レンバチニ ブメシル酸 塩	根治切除不能な甲状腺癌	通常、成人にはレンバチニブとして1日1回24mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	新有効成分

内用薬	ポマリスト カプセル1mg	1mg 1 カプセル	セルジーン	ポマリドミド	再発又は難治性の多発性 骨髄腫	デキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはポマリドミドとして1日1回4mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。 なお、患者の状態により適宜減量する。	毒、処方	新有効成分
	ポマリスト カプセル2mg	2mg 1 カプセル						
	ポマリスト カプセル3mg	3mg 1 カプセル						
	ポマリスト カプセル4mg	4mg 1 カプセル						
内用薬	アシテアダニ 舌下錠 100単位 (IR)	100IR1 錠	塩野義製薬	なし(ヤケ ヒョウヒダニ エキス原末 及びコナヒョ ウヒダニエ クス原末を 含有する 舌下錠)	ダニ抗原によるアレルギー性 鼻炎に対する減感作療法	通常、成人及び12歳以上の小児には、1回100単位 (IR) を1日1回舌下投与から開始し、1回投与量は100単位 (IR) ずつ、300単位 (IR) まで増量する。なお、漸増期間は、原則として3日間とするが、患者の状態に応じて適宜延長する。舌下投与後は完全に溶解するまで保持した後、飲み込む。その後5分間は、うがいや飲食を控える。	処方	新有効成分
	アシテアダニ 舌下錠 300単位 (IR)	300IR1 錠						
内用薬	ソバルディ錠 400mg	400mg1 錠	ギリアド・サイエンシズ	ソホスブビル	セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	リバビリンとの併用において、通常、成人にはソホスブビルとして400mgを1日1回、12週間経口投与する。	処方	新有効成分
注射薬	エビリファイ 持続性水懸 筋注用300mg	300mg1 瓶 (懸濁用液 付)	大塚製薬	アリピプラ ゾール 水和物	統合失調症	通常、成人にはアリピプラゾールとして1回400mgを4週に1回臀部筋肉内に投与する。なお、症状、忍容性に応じて1回量300mgに減量すること。	劇、処方	新投与経路
	エビリファイ 持続性水懸 筋注用400mg	400mg 1 瓶 (懸濁用液 付)						

	エビリファイ持 続性水懸 筋注用300mg シリンジ	300mg 1 キット						
	エビリファイ持 続性水懸 筋注用400mg シリンジ	400mg 1 キット						
注射薬	サイラムザ 点滴静注液 100mg	100mg10mL 1 瓶	日本イーラ イリリー	ラムシルマ ブ(遺伝子 組換え)	治療切除不能な進行・再発の 胃癌	通常、成人には2週間に1回、ラムシルマブ(遺伝子組換え)として1回8mg/kg(体重) をおよそ60分かけて点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。	生物、 劇、処方	新有効成分
	サイラムザ 点滴静注液 500mg	500mg50mL 1 瓶						
注射薬	オルドレブ 点滴静注用 150mg	150mg1 瓶	グラクソ・ス ミスクライン	コリスチンメ タンスルホ ン酸ナトリウ ム	<適応菌種>コリスチンに感性 の大腸菌、シトロバクター属、ク レブシエラ属、エンテロバクター 属、緑膿菌、アシネトバクター属 ただし、他の抗菌薬に耐性を示し た菌株に限る <適応症> 各種感染症	通常、成人には、コリスチンとして1回1.25～2.5mg(力価)/kgを1日2回、30分以上 かけて点滴静注する。	劇、処方	新投与経路
注射薬	ノボサーティ ーン静注用 2500	2,500国際単 位1瓶 (溶解液付)	ノボノルディ スクファーマ	カトリデカコ グ(遺伝子 組換え)	先天性血液凝固第XⅢ因子Aサ ブユニット欠乏患者における出血 傾向の抑制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、2mL/分を超えない速度で緩徐に静脈内に注射 する。体重1kg当たり35国際単位を4週ごとに定期的に投与する。なお、出血時に投 与する場合、体重1kg当たり35国際単位を投与することができる。	処方	新有効成分

